

Premost'ujúce režimy

rivaroxaban (priamy inhibítor FXa)

- prvá dávka rivaroxabanu 6 - 10 hod po operácii (pri dosiahnutej hemostáze)
- epidurálny katéter odstránime ≥ 18 hod od poslednej aplikácie lieku
- po odstránení epidurálneho katétra ≥ 6 hod podáme nasledujúcu dávku lieku

otázka č.1 : ako odporučiť termín operačného zákroku po podaní rivaroxabanu

odpoveď: 24 hod interval medzi poslednou aplikáciou rivaroxabanu a začatím operácie + začatím tromboprophylaxie podľa typu operačného zákroku

otázka č.2: ako odporučiť prechod z rivaroxabanu na LMWH

odpoveď: 24 hod interval medzi poslednou aplikáciou rivaroxabanu a prvým podaním LMWH

otázka č. 3a) ako odporučiť prechod z rivaroxabanu na kumaríny

odpoveď: kumaríny 2-3 dni spolu s rivaroxabanom (rivaroxaban vysadiť, ak hodnota INR dosiahne $\geq 2,0$)

otázka č. 3b) ako odporučiť prechod z kumarínov na rivaroxaban

odpoveď: vysadiť kumaríny, prvá aplikácia rivaroxabanu (pri INR $< 1,5 - 2,0$)

Poznámky:

- premost'ujúca liečba musí byť u každého pacienta aplikovaná individuálne
- rivaroxaban nemá špecifické antidotum, preto v prípade vitálne indikovaného chirurgického zákroku, v čase jeho užívania, je potrebné upraviť hemostázu rekombinantným aktivovaným FVII (rFVIIa) po konzultácii s hematológom

Odporúčanie bolo schválené Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu (SSHT), www.ssht.sk, členom Federácie európskych spoločností trombózy a hemostázy (FETHRO), www.etro.eu.org a www.gth-online.org